

28 gennaio 2020

Informativa ai lavoratori: Coronavirus 2019-nCoV.

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha rappresentato che le autorità sanitarie cinesi hanno identificato un nuovo ceppo di Coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il Coronavirus 2019-nCoV. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. La situazione epidemiologica è oggi in continua evoluzione e l'OMS ha alzato il livello del rischio di pandemia.

Il Ministero della Salute ha istituito una task force di prevenzione che, per il momento, si è limitata ad incrementare il controllo negli aeroporti internazionali dei viaggiatori che provengono dall'area endemica.

Ciò che può essere fatto in questo momento dalla popolazione generale e dai lavoratori che operano a contatto con l'utenza o all'interno di comunità, è mettere in atto quelle misure di igiene e protezione individuali che sono consigliate per l'influenza, malattia infettiva che ha caratteristiche epidemiologiche molto simili a quella provocata dal Coronavirus 2019-nCoV.

Misure di igiene e protezione individuale.

La trasmissione interumana del virus dell'influenza, così come quella del Coronavirus, si può verificare **per via aerea** attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso **il contatto con le mani** contaminate dalle secrezioni respiratorie. Per questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un ruolo importante nel limitare la diffusione dell'influenza. Queste le misure più efficaci.

- Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone. In assenza di acqua sono utili i gel disinfettanti. **Fortemente raccomandato.**
- Adottare una buona igiene respiratoria (coprire con un fazzoletto usa e getta la bocca e il naso quando si starnutisce o tossisce, o farlo con il gomito flesso. Gettare poi fazzoletti in un contenitore chiuso e lavarsi le mani. **Raccomandato.**
- Le persone con malattie respiratorie febbrili, specie in fase iniziale, dovrebbero isolarsi volontariamente a casa. **Raccomandato.**
- Le persone con sintomatologia influenzale dovrebbero fare uso di mascherine quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali). **Raccomandato.**

Il medico competente
Dottor Angelo Casuccio

